



**“วันโรคไข้มองอักเสบโลก” –**

**เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของสาธารณชนและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคไข้มองอักเสบ**  
**/ภาวะสมองผิดปกติ: การสังเกตอาการตั้งแต่เนิ่นๆ การวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะแรก**  
**และการป้องกัน**

แถลงการณ์ร่วมโดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชีย (ASPID),  
 สมาคมกุมารเวชศาสตร์เอเชียแปซิฟิก (APPA), สมาคมแพทย์แผนจีนฮ่องกง จำกัด (HKCMA),  
 สมาคมภูมิคุ้มกันวิทยา ภูมิแพ้ และโรคติดเชื้อในเด็กแห่งฮ่องกง (HKSPIAID),  
 สมาคมกุมารเวชศาสตร์มาเก๊า, สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งฟิลิปปินส์ (PIDSP),  
 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย (PIDST),  
 กลุ่มทำงานด้านโรคติดเชื้อและโรคเขตร้อนของสมาคมกุมารเวชศาสตร์อินโดนีเซีย,  
 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งญี่ปุ่น (JSPID), สมาคมกุมารเวชศาสตร์สิงคโปร์,  
 กลุ่มโรคติดเชื้อของสมาคมกุมารเวชศาสตร์ปากีสถาน, สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งบังกลาเทศ  
 (BSPID), สถาบันโรคติดเชื้อในเด็กแห่งอินเดีย, สมาคมกุมารเวชศาสตร์มาเลเซีย,  
 วิทยาลัยกุมารแพทย์ศรีลังกา, The คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยอาเซตเตเป  
 แผนกโรคติดเชื้อในเด็ก กรุงอังการา ประเทศตุรกี

เนื่องใน "วันโรคไข้มองอักเสบโลก" สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชีย (ASPID)  
 และสมาคมทางการแพทย์ 15 แห่ง ได้ออกแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ  
 "โรคไข้มองอักเสบ" ซึ่งเป็นการอักเสบของสมองที่เกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อโรคอื่นๆ และ  
 "โรคสมองเสื่อม" ซึ่งเป็นความผิดปกติของสมองที่ไม่ใช่การอักเสบ แต่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคต่างๆ  
 เนื่องจากการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ไม่สมดุล  
 โรคไข้มองอักเสบ/โรคสมองเสื่อมทำให้มีอัตราการเสียชีวิตและเจ็บป่วยสูงทั่วโลก  
 ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคไข้มองอักเสบ/โรคสมองเสื่อมอาจแสดงอาการต่อเนื่อง เช่น  
 ปัญหาพฤติกรรม โรคกระตุก ปวดศีรษะเรื้อรัง ความผิดปกติของการนอนหลับ  
 ความพิการทางการเคลื่อนไหว และความบกพร่องทางการรับรู้และสติปัญญา  
 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวอย่างมาก

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะดึงดูดความสนใจและการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา  
 ในการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพที่ประสานงานกันสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขา

การตรวจพบอาการและสัญญาณของโรคใช้สมองอักเสบ/ภาวะสมองผิดปกติในระยะเริ่มต้น จะช่วยให้วินิจฉัยและรักษาได้ทันที่  
ลดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวของโรคใช้สมองอักเสบ/ภาวะสมองผิดปกติได้

อาการและสัญญาณเหล่านี้ได้แก่:

- มีไข้
- ปวดศีรษะ
- ไวต่อแสงและ/หรือเสียง
- คอแข็ง
- ง่วงซึมหรือเซื่องซึม
- หงุดหงิดง่ายขึ้น
- ชัก
- ผื่นขึ้นตามผิวหนัง
- พูดลำบากและพูดไม่ชัด
- สติสัมปชัญญะเปลี่ยนแปลง สับสน หรือเห็นภาพหลอน
- อ่อนเพลีย
- เบื่ออาหาร
- เดินเซ
- คลื่นไส้และอาเจียน

ที่สำคัญที่สุดคือ สาเหตุของโรคใช้สมองอักเสบ/ภาวะสมองผิดปกติเฉียบพลันจากไวรัสบางชนิด สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน เช่น... ไข้หวัดใหญ่, โควิด-19, ไวรัสเดงกี, ไวรัสใช้สมองอักเสบญี่ปุ่น, หัด, คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR) และไวรัสฮิสทีโอไซ เป็นต้น

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรทางการแพทย์ของเราจะส่งเสริมการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมแก่แต่ละบุคคลตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์การดำรงชีวิต  
โดยพิจารณาจากความเสี่ยงด้านสุขภาพของแต่ละบุคคล

สมาชิกของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชีย (ASPID)

ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีน คำแนะนำ และการดำเนินการ ASPID

จะยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติอย่างใกล้ชิด

เพื่อติดตามโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ สนับสนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพ

และส่งเสริมความเชื่อมั่นในวัคซีน เพื่อปกป้องสุขภาพของเด็กและชุมชนทั่วเอเชียและที่อื่นๆ

22 กุมภาพันธ์ 2569